

# สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 2569: ป้องกันไว้อย่างประมาท อันตรายถึงชีวิต

ปัญหา

สถานการณ์วิกฤตและอันตรายของโรค



แนวทางแก้ไข

3 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย



ผู้เสียชีวิตแล้ว  
**5 ราย**  
ในปี 2569

กระจายในจังหวัดระยอง นครราชสีมา  
ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี และตาก



ติดเชื้อแล้วเสียชีวิต  
**100%**

หากได้รับเชื้อและไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน  
จะเสียชีวิตทุกรายโดยไม่มีทางรักษา



**ล้างแผลและพบแพทย์ทันที**  
ล้างด้วยน้ำและสบู่ แล้วรีบไปฉีดวัคซีน  
ให้ครบชุด แม้มูกัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย



**ห้ามนำเนื้อหรือก้นซากสัตว์**  
ห้ามนำซากสัตว์ที่ตายผิดปกติ  
มาประกอบอาหารโดยเด็ดขาด



**พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนสม่ำเสมอ**  
นำสุนัขและแมวอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป  
ไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำ



**ป้องกันไว้ก่อน ปลอดภัย**  
การปฐมพยาบาล การรับวัคซีน และการ  
ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นวิธีป้องกันสำคัญที่สุด



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี



# 10 ข้อควรระวัง เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า



**1** โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย




**2** โรคพิษสุนัขบ้า สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วย เช่น แมว ชะนี ลิง กระจอก กระแต หมู ค่างคาว หรือแม้กระทั่ง วัว ควาย ม้า สุนัข


**3** สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุด กว่า **95%** ของผู้เสียชีวิตมาจากสุนัข


**4**  สุนัขและแมว ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำลาย




**5** **คาถา 5 ย.** ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า **อย่าแห่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง**

**6**  หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบ ล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสะอาด และสบู่ หลาย ๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

**7**  ควรมารับวัคซีนตามกำหนดเวลา อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเฝ้าระวัง สุนัขหรือแมวที่มากัดเป็นเวลา 10 วัน หากสัตว์ตายระหว่างดูอาการ ให้แจ้ง ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตัดหัวสุนัข ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

**8**  อาการสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ระยะเริ่มแรก เช่น สุนัขจะมีอารมณ์ และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ม่านตา ขยายกว้างกว่าปกติ กินข้าวกินน้ำ น้อยลง การเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติ

**9** ต้องพาสุนัขหรือแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

**10**  ไม่ปล่อยให้สุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ตามลำพัง ต้องใส่สายจูงเมื่อพาสุนัข ออกนอกบ้าน ถ้าสุนัขดูควรสวมเครื่อง ป้องกันสุนัขกัด

# โรคพิษสุนัขบ้า



เป็นแล้วตาย  
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คำแนะนำ  
สำหรับคนเลี้ยง  
สุนัขและแมว



**ฉีดวัคซีน**

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป  
ปีแรก ฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี



**ทำหมัน**

ไม่ให้มีลูกมากเกินไป




**เลี้ยงในรั้วบ้าน**

ไม่ปล่อยให้พเนจร  
ในที่สาธารณะ

เมื่อถูก  
สุนัขหรือแมว  
กัด ข่วน เลีย  
บาดแผล ต้องรีบ...



คนหรือสัตว์  
เมื่อแสดงอาการจะ  
ตายทุกราย!!



สุนัขหรือแมว  
ที่มีเจ้าของ  
ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้  
ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน



โรคนี้  
ไม่ได้เป็น  
เฉพาะหน้าร้อน

"ล้างแผล ใส่ยา กักหมา ฆ่าหมอม ฉีดวัคซีนให้ครบชุด"



**ล้างแผล**

ด้วยสบู่และน้ำสะอาด  
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



**ใส่ยา**

รักษาแผลสด



**กักหมา**

ไว้ดูอาการ 10 วัน  
หากตายรีบแจ้งปศุสัตว์



**ฆ่าหมอม**

เพื่อรับการป้องกันโรค  
และมาตามนัดทุกครั้ง

**คาถา 5 ย** ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



**อย่า แทะ**

หรือเล่นกับสุนัขแรงๆ  
ให้ตกใจ หรือโมโห

สุนัขให้ตกใจ

**อย่า เหยียบ**



**อย่า แทะ**

สุนัขที่กำลังกัดกัน

จานข้าวที่สุนัข  
หรือแมวกำลังกิน

**อย่า หยิบ**



**อย่า รุง**

กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ

**ทำบุญได้บาป**



**โปรด หยุด**  
ให้อาหารแก่สุนัข  
หรือแมวจรจัด

เพราะอาจทำให้สุนัขหรือแมวจรจัดกัดกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และทำให้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการกัดคน และแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นด้วย

